

Гомологии

§ 1. Комплексы

Пусть A — кольцо. Под *открытым комплексом* A -модулей понимают последовательность модулей и гомоморфизмов $\{(E_i, d_i)\}$,

$$\rightarrow E_{i-1} \xrightarrow{d_{i-1}} E_i \xrightarrow{d_i} E_{i+1} \rightarrow,$$

где i пробегает все целые числа и d_i отображает E_i в E_{i+1} , причем

$$d_i \circ d_{i-1} = 0$$

для всех i .

Часто рассматривают конечные последовательности гомоморфизмов, скажем

$$E_1 \rightarrow \dots \rightarrow E_r,$$

в которых композиция двух последовательных гомоморфизмов равна 0; такую последовательность можно превратить в комплекс, добавив нули на каждом конце

$$\rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow E_1 \rightarrow \dots \rightarrow E_r \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow.$$

Замкнутый комплекс A -модулей — это последовательность модулей и гомоморфизмов $\{(E_i, d_i)\}$, где i пробегает множество целых чисел по модулю n для некоторого $n \geq 2$, удовлетворяющая тому же свойству, что и выше, для композиций последовательных гомоморфизмов. Таким образом, замкнутый комплекс выглядит так:

$$\begin{array}{ccccccc} E_1 & \rightarrow & E_2 & \rightarrow & \dots & \rightarrow & E_n \\ \uparrow & & & & & & \downarrow \\ & & & & & & \\ & & & & & & \end{array}$$

Мы называем n *длиной* замкнутого комплекса.

Можно, не опасаясь путаницы, опускать индекс i в d_i и писать просто d . Мы будем также обозначать комплекс $\{(E_i, d_i)\}$ через (E, d) и даже, еще короче, просто через E .

Пусть (E, d) и (E', d') — два комплекса (оба открытые или оба замкнутые), r — целое число. *Морфизм* (комплексов)

$$f: (E', d') \rightarrow (E, d)$$

степени r — это последовательность гомоморфизмов

$$f_i: E'_i \rightarrow E_{i+r},$$

таких, что для всякого i коммутативна следующая диаграмма:

$$\begin{array}{ccc} E'_{i-1} & \xrightarrow{f_{i-1}} & E_{i-1+r} \\ d' \downarrow & & \downarrow d \\ E'_i & \xrightarrow{f_i} & E_{i+r} \end{array}$$

Точно так же как мы пишем d вместо d_i , мы будем писать f вместо f_i . Если комплексы замкнуты, то мы определяем морфизм одного в другой только в том случае, если они имеют одинаковую длину.

Ясно, что комплексы образуют категорию.

Будет полезно ввести еще одно понятие, относящееся к объектам, занумерованным посредством моноида. Пусть G — моноид, который мы предположим коммутативным и аддитивным, имея в виду дальнейшие приложения. Пусть $\{M_i\}_{i \in G}$ — семейство модулей, занумерованных посредством G . Прямая сумма

$$M = \coprod_{i \in G} M_i$$

будет называться G -градуированным модулем, ассоциированным с семейством $\{M_i\}_{i \in G}$. Пусть $\{M_i\}_{i \in G}$ и $\{M'_i\}_{i \in G}$ — два семейства, занумерованные посредством G , и M, M' — ассоциированные с ними G -градуированные модули. Пусть $r \in G$. Под G -градуированным морфизмом $f: M' \rightarrow M$ степени r мы будем понимать гомоморфизм f , отображающий M'_i в M_{i+r} для всякого $i \in G$ (при этом M_i отождествляется с соответствующим подмодулем прямой суммы). Таким образом, f есть не что иное, как семейство гомоморфизмов $f_i: M'_i \rightarrow M_{i+r}$.

Если (E, d) — комплекс, то мы можем рассматривать E как G -градуированный модуль (взяв прямую сумму членов этого комплекса), а d — как G -градуированный морфизм степени 1, полагая G равным \mathbf{Z} или $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$.

Обратно, если G есть \mathbf{Z} или $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$, то мы можем рассматривать G -градуированный модуль как комплекс, считая по определению d нулевым отображением.

Для простоты мы будем часто опускать эпитет „ G -градуированный“ перед словом „морфизм“, когда речь будет идти о G -градуированных морфизмах.