

§ 9. Знакопеременные формы

Пусть E — векторное пространство над полем k , на которое мы не налагаем теперь никаких ограничений. Пусть f — знакопеременная форма на E , т. е. билинейное отображение $f: E \times E \rightarrow k$, такое, что $f(x, x) = x^2 = 0$ для всех $x \in E$. Тогда

$$x \cdot y = -y \cdot x$$

для всех $x, y \in E$, что обнаруживается подстановкой $(x + y)$ вместо x в соотношение $x^2 = 0$.

Как и для симметрических форм, мы определяем *гиперболическую плоскость* (для знакопеременных форм) как двумерное невырожденное пространство. (На этот раз мы автоматически получаем элемент ω , такой, что $\omega^2 = 0$, $\omega \neq 0$, так что нет надобности специально выделять это.) Если P — гиперболическая плоскость и $\omega \in P$, $\omega \neq 0$, то в P существует элемент $y \neq 0$, для которого $\omega \cdot y \neq 0$. Деля y на константу, мы можем считать, что $\omega \cdot y = 1$. Тогда $y \cdot \omega = -1$. Следовательно, матрица формы относительно базиса $\{\omega, y\}$ имеет вид

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Как и прежде, пара ω, y называется *гиперболической парой*. Если заданы двумерное векторное пространство над k с билинейной формой и пара элементов $\{\omega, y\}$, удовлетворяющих соотношениям

$$\omega^2 = y^2 = 0, \quad y \cdot \omega = -1, \quad \omega \cdot y = 1,$$

то легко видеть, что рассматриваемая форма знакопеременная и (ω, y) — гиперболическая плоскость для этой формы.

При заданной знакопеременной форме f на E мы будем говорить, что пространство E (или f) *гиперболическое*, если E является ортогональной суммой гиперболических плоскостей. Мы будем говорить, что E (или f) *нулевое*, если $x \cdot y = 0$ для всех $x, y \in E$.

Теорема 6. Пусть f — знакопеременная форма на векторном пространстве E над k . Тогда E будет ортогональной суммой своего ядра и гиперболического подпространства. Если E невырождено, то E является гиперболическим пространством и его размерность четна.

Доказательство. Дополнительное подпространство к ядру невырождено, и, следовательно, мы можем считать, что E невырождено. Пусть $\omega \in E$, $\omega \neq 0$. Существует элемент $y \in E$, для которого $\omega \cdot y \neq 0$. Тогда подпространство (ω, y) невырождено, следовательно, является гиперболической плоскостью P . Имеем $E = P \oplus P^\perp$, и P^\perp невырождено. Заканчиваем доказательство по индукции.

ременной матрицей. Пусть f — симметрическая невырожденная форма на E , задаваемая относительно этого базиса матрицей

$$\begin{pmatrix} 0 & I_r \\ I_r & 0 \end{pmatrix}.$$

Тогда мы получаем разложение E в прямую сумму подпространств E_1, E_2 (соответствующих первым n и соответственно последним n координатам), такое, что

$$\Omega(x, y) = f(x_1, y_2) - f(x_2, y_1).$$

Так как форма \langle, \rangle предполагается невырожденной, то мы можем найти автоморфизм A , обладающий желаемым свойством, причем A является симметрическим, поскольку форма f симметрическая.

§ 10. Пфаффиан

У знакопеременной матрицы G по определению ${}^tG = -G$ и диагональные элементы равны 0. Как мы видели в гл. XIII, § 6, это матрица знакопеременной формы. Пусть G — матрица размера $n \times n$, где n — четное. (Для нечетного n см. упражнения.)

Мы начнем с поля характеристики 0. В силу теоремы 6 существует неособая матрица C , для которой tCCG будет матрицей

$$\begin{pmatrix} 0 & I_r & 0 \\ -I_r & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

и, следовательно,

$$\det(C)^2 \det(G) = 1 \quad \text{или} \quad 0$$

в соответствии с тем, тривиально ядро знакопеременной формы или нет. Таким образом, мы видим, что в любом случае $\det(G)$ является квадратом в поле.

Перейдем теперь к кольцу целых чисел \mathbf{Z} . Пусть t_{ij} ($1 \leq i < j \leq n$) — $n(n-1)/2$ алгебраически независимых элементов над \mathbf{Q} . Положим $t_{ii} = 0$ для $i = 1, \dots, n$ и $t_{ij} = -t_{ji}$ для $i > j$. Тогда матрица $T = (t_{ij})$ — знакопеременная и, следовательно, $\det(T)$ есть квадрат в поле $\mathbf{Q}(t)$, полученном из \mathbf{Q} присоединением всех переменных t_{ij} . Однако $\det(T)$ является многочленом из $\mathbf{Z}[t]$ и в силу однозначности разложения на множители в $\mathbf{Z}[t]$ $\det(T)$ — квадрат некоторого многочлена из $\mathbf{Z}[t]$. Запишем

$$\det(T) = P(t)^2.$$