

Представление одного эндоморфизма

§ 1. Представления

Пусть k — коммутативное кольцо и E — модуль над k . Как обычно, мы обозначаем через $\text{End}_k(E)$ кольцо k -эндоморфизмов E , т. е. кольцо k -линейных отображений E в себя.

Пусть R — некоторая k -алгебра (задаваемая кольцевым гомоморфизмом $k \rightarrow R$, который позволяет нам рассматривать R как k -модуль). Под *представлением* R в E понимают гомоморфизм k -алгебр $R \rightarrow \text{End}_k(E)$, т. е. кольцевой гомоморфизм $\rho: R \rightarrow \text{End}_k(E)$, для которого коммутативна следующая диаграмма:

$$\begin{array}{ccc} R & \longrightarrow & \text{End}_k(E) \\ & \swarrow \scriptstyle k & \searrow \\ & & \end{array}$$

[Как обычно, мы рассматриваем $\text{End}_k(E)$ как k -алгебру; если I обозначает тождественное отображение модуля E , то имеем гомоморфизм кольца k в $\text{End}_k(E)$, задаваемый отображением $a \mapsto aI$. Мы будем использовать I также для обозначения единичной матрицы, когда выбраны базисы. Что мы имеем в виду, всегда будет ясно из контекста.]

Мы встретимся в дальнейшем с несколькими примерами представлений для различных типов колец (и коммутативных, и некоммутативных). В этой главе все кольца будут коммутативными.

Заметим, что E можно рассматривать как $\text{End}_k(E)$ -модуль. Следовательно, E можно рассматривать как R -модуль, определив действие R на E следующим образом:

$$(x, v) \mapsto \rho(x)v,$$

где $x \in R$ и $v \in E$. Мы будем обычно писать xv вместо $\rho(x)v$.

Подгруппа F в E , такая, что $RF \subset F$, будет называться *инвариантным* подмодулем в E . (Она одновременно R -инвариантна и k -инвариантна.) Мы будем также говорить, что она инвариантна относительно данного представления.

Мы будем говорить, что представление *неприводимо*, или *просто*, если $E \neq 0$ и если единственными инвариантными подмодулями

являются 0 и E . Неприводимым (или простым) называется в этом случае и сам модуль E .

Цель теории представлений состоит в том, чтобы описать структуру всех представлений различных интересных колец и классифицировать их неприводимые представления. В большинстве случаев мы будем брать в качестве k поле, которое может быть, а может и не быть алгебраически замкнутым. Трудности в доказательстве теорем о представлениях могут поэтому лежать в сложности или кольца R , или поля k , или модуля E , или всех трех вместе.

Указанное выше представление ρ называется *вполне приводимым*, или *полупростым*, если E есть R -прямая сумма R -подмодулей E_i

$$E = E_1 \oplus \dots \oplus E_m,$$

причем каждый E_i неприводим. Мы также говорим, что E вполне приводим. Неверно, что все представления вполне приводимы, и, например, те, которые мы будем рассматривать в этой главе, как правило, не будут такими. Некоторые типы вполне приводимых представлений будут изучены позже.

Имеется специальный тип представлений, который будет встречаться особенно часто. Пусть $v \in E$, и пусть $E = Rv$. Мы пишем также $E = (v)$. Тогда мы говорим, что модуль E — *главный* (над R) и что представление — *главное*. В этом случае множество элементов $x \in R$, для которых $xv = 0$, будет левым идеалом α в R (очевидно). Отображение R в E , задаваемое правилом

$$x \mapsto xv,$$

индуцирует изоморфизм R -модулей

$$R/\alpha \rightarrow E$$

(R рассматривается как левый модуль над собой и R/α — как фактормодуль). При этом отображении единичному элементу 1 кольца R сопоставляется образующая v модуля E .

Примем следующее соглашение: если $v_1, \dots, v_n \in E$, то будем обозначать через (v_1, \dots, v_n) подмодуль в E , порожденный элементами v_1, \dots, v_n .

Пусть E имеет некоторое разложение в прямую сумму R -подмодулей

$$E = E_1 \oplus \dots \oplus E_s.$$

Предположим, что каждый E_i свободен и имеет размерность ≥ 1 над k . Пусть $\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_s$ — базисы над k для E_1, \dots, E_s соответственно. Тогда $\{\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_s\}$ есть базис для E . Пусть $\varphi \in R$, φ_i — эндоморфизмы, индуцированные φ на E_i , и M_i — матрица φ_i относительно базиса \mathcal{B}_i . Тогда матрица M эндоморфизма φ относительно

$\{\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_s\}$ принимает вид

$$\begin{pmatrix} M_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & M_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & M_s \end{pmatrix}.$$

Про матрицу такого типа говорят, что она разлагается на *блоки* M_1, \dots, M_s . При наличии такого разложения изучение эндоморфизма φ или его матрицы полностью сводится (так сказать) к изучению блоков.

Это случается далеко не всегда, однако часто имеет место нечто почти столь же хорошее. Пусть E' — подмодуль в E , инвариантный относительно R . Предположим, что имеется базис E' над k , скажем $\{v_1, \dots, v_m\}$, и что этот базис может быть дополнен до базиса

$$\{v_1, \dots, v_m, v_{m+1}, \dots, v_n\}.$$

Это всегда так, если k — поле.

Пусть $\varphi \in R$. Тогда матрица эндоморфизма φ относительно этого базиса имеет вид

$$\begin{pmatrix} M' & * \\ 0 & M'' \end{pmatrix}.$$

Действительно, так как E' отображается при φ в себя, то ясно, что мы получим M' в левом верхнем углу и нулевую матрицу под ним. Кроме того, для всякого $j = m+1, \dots, n$ мы можем записать

$$\varphi v_j = c_{j1}v_1 + \dots + c_{jm}v_m + c_{j,m+1}v_{m+1} + \dots + c_{jn}v_n.$$

Транспонируя матрицу (c_{ji}) , получаем матрицу

$$\begin{pmatrix} * \\ M'' \end{pmatrix},$$

стоящую справа в матрице, представляющей φ .

Рассмотрим, далее, точную последовательность

$$0 \rightarrow E' \rightarrow E \rightarrow E'' \rightarrow 0.$$

Пусть $\bar{v}_{m+1}, \dots, \bar{v}_n$ — образы v_{m+1}, \dots, v_n при каноническом отображении $E \rightarrow E''$. Мы можем естественным образом определить линейное отображение

$$\varphi'': E'' \rightarrow E'',$$

так чтобы $\overline{\varphi v} = \varphi''(\bar{v})$ для всех $v \in E$. Тогда ясно, что матрицей для φ'' относительно базиса $\{\bar{v}_{m+1}, \dots, \bar{v}_n\}$ служит M'' .