

Предложение 13. Пусть E — свободный модуль размерности n над k , $\{v_1, \dots, v_n\}$ — некоторый базис для E над k . Элементы этого базиса, рассматриваемые как элементы из $S^1(E)$ в $S(E)$, алгебраически независимы над k , и алгебра $S(E)$ изоморфна поэтому алгебре многочленов от n переменных над k .

Доказательство. Взяв алгебраически независимые переменные t_1, \dots, t_n над k , образуем алгебру многочленов $k[t_1, \dots, t_n]$. Пусть P_r — k -модуль однородных многочленов степени r . Определим отображение $E^{(r)} \rightarrow P_r$ следующим образом. Если w_1, \dots, w_r — элементы из E , которые могут быть записаны в виде

$$w_i = \sum_{v=1}^n a_{iv} v, \quad i = 1, \dots, r,$$

то наше отображение задается правилом

$$(w_1, \dots, w_r) \mapsto (a_{11}t_1 + \dots + a_{1n}t_n) \dots (a_{r1}t_1 + \dots + a_{rn}t_n).$$

Очевидно, что это отображение полилинейно и симметрично. Следовательно, оно может быть пропущено через линейное отображение $S^r(E)$ в P_r :

$$\begin{array}{ccc} E^{(r)} & \longrightarrow & S^r(E) \\ & \searrow & \swarrow \\ & & P_r \end{array}$$

Из коммутативности нашей диаграммы ясно, что для всякого набора из r целых чисел $(i) = (i_1, \dots, i_r)$ элемент $v_{i_1} \dots v_{i_r}$ из $S^r(E)$ отображается на $t_{i_1} \dots t_{i_r}$ в P_r . Так как одночлены $M_{(i)}(t)$ степени r линейно независимы над k , то одночлены $M_{(i)}(v)$ в $S^r(E)$ также линейно независимы над k , и наше отображение $S^r(E) \rightarrow P_r$ является изоморфизмом. Тотчас проверяется, что умножение в $S(E)$ соответствует умножению многочленов в $k[t]$ и, следовательно, отображение $S(E)$ в алгебру многочленов, описанное выше для каждой компоненты $S^r(E)$, индуцирует изоморфизм алгебры $S(E)$ на алгебру $k[t]$, что и требовалось.

§ 8. Кольцо Эйлера — Гротендика

Пусть k — поле и G — группа. Под (G, k) -модулем мы будем понимать пару (E, ρ) , состоящую из k -пространства E и гомоморфизма

$$\rho: G \rightarrow \text{Aut}_k(E).$$

Такой гомоморфизм называется также *представлением* G в E . Допуская вольность речи, мы будем также говорить, что k -пространство E является G -модулем. Группа G действует на E , и мы пи-

шем σx вместо $\rho(\sigma)x$. Поле k во всем последующем будет оставаться фиксированным.

Пусть $\mathfrak{M}(G)$ обозначает категорию, объектами которой являются (G, k) -модули. Морфизмами в $\mathfrak{M}(G)$ служат так называемые G -гомоморфизмы, т. е. k -линейные отображения $f: E \rightarrow F$, такие, что $f(\sigma x) = \sigma f(x)$.

Если E — G -модуль и $\sigma \in G$, то мы имеем по определению k -автоморфизм $\sigma: E \rightarrow E$. Поскольку T^r — функтор, для всякого r имеем индуцированный автоморфизм

$$T^r(\sigma): T^r(E) \rightarrow T^r(E),$$

так что $T^r(E)$ также является G -модулем. Беря прямую сумму, мы видим, что $T(E)$ есть G -модуль и, следовательно, T — функтор из категории G -модулей в категорию градуированных G -модулей. Аналогично для \wedge^r , S^r и \wedge , S .

Ясно, что ядром G -гомоморфизма будет G -модуль и фактормодулем G -модуля по G -подмодулю — снова G -модуль. Пусть \mathfrak{M}_G — множество классов (G, k) -модулей относительно G -изоморфизма. Это множество является моноидом, сложение в котором представляется на модулях прямой суммой. Имеем гомоморфизм Гротендика

$$\gamma: \mathfrak{M}_G \rightarrow K(G)$$

моноида \mathfrak{M}_G в группу Гротендика $K(G)$, взятую относительно точных последовательностей (ср. также с конструкцией в гл. IV, § 3). Для простоты мы пишем $K(G)$ вместо $K(\mathfrak{M}_G)$.

Если $[E]$ обозначает класс E относительно изоморфизма, то будем также писать $\gamma(E)$ вместо $\gamma([E])$.

Если E, F — G -модули, то их тензорное произведение $E \otimes F$ над k также является G -модулем. Здесь снова действие G на $E \otimes F$ задается функториально. Для всякого $\sigma \in G$ существует однозначно определенное k -линейное отображение $E \otimes F \rightarrow E \otimes F$, такое, что для $x \in E, y \in F$ имеем $x \otimes y \mapsto \sigma(x) \otimes \sigma(y)$. Тензорное произведение индуцирует закон композиции на \mathfrak{M}_G , так как тензорные произведения G -изоморфных модулей G -изоморфны. Мы утверждаем, что \mathfrak{M}_G является также мультипликативным моноидом. Наш закон композиции ассоциативен, поскольку тензорное произведение ассоциативно. Существует единичный элемент, а именно класс модуля k над G , причем действие G на k определяется правилом $(\sigma, a) \mapsto a$ для всех $\sigma \in G$ и $a \in k$ (таким образом, $\sigma a = a$).

Произведение на \mathfrak{M}_G , очевидно, дистрибутивно относительно сложения, так как тензорное произведение прямой суммы есть прямая сумма тензорных произведений.

Наконец, поскольку $E \otimes F$ G -изоморфно $F \otimes E$, наше умножение в \mathfrak{M}_G коммутативно. Таким образом, \mathfrak{M}_G — моноид относительно сложения и коммутативный моноид относительно тензорного произведения,

причем умножение в нем \mathbf{Z} -билинейно по отношению к сложению.

Так как k — поле, то тензорное умножение точной последовательности G -модулей над k на любой G -модуль над k сохраняет точность. Благодаря этому можно определить произведение в $K(G)$, которое однозначно задается условием

$$\gamma(E)\gamma(F) = \gamma(E \otimes F)$$

для всех G -модулей E, F . Отсюда тривиально следует, что $K(G)$ есть кольцо и что γ — гомоморфизм как для аддитивного, так и для мультипликативного закона на \mathfrak{M}_G . Поэтому мы можем назвать $K(G)$ *кольцом Гротендика* группы G (над k). Так как G фиксирована, то мы будем также писать K вместо $K(G)$.

Если E — G -модуль, то мы пишем $\lambda^i(E)$ для обозначения элемента $\gamma(\wedge^i(E))$, другими словами, элемента в $K(G)$, который является образом при γ модуля $\wedge^i(E)$ или, более точно, класса этого модуля относительно изоморфизма.

Определим теперь отображение \mathfrak{M}_G в кольцо степенных рядов $K[[t]]$, а именно отображение λ_t , такое, что

$$\lambda_t(E) = \sum_{i=0}^{\infty} \lambda^i(E) t^i.$$

Так как $\wedge^0(E) = k$, то $\lambda^0(E) = 1$. Следовательно, наше отображение является на самом деле отображением в мультипликативную группу степенных рядов, начинающихся с 1. Мы будем записывать эту группу в виде

$$1 + tK[[t]].$$

Таким образом, λ_t есть отображение

$$\lambda_t: \mathfrak{M}_G \rightarrow 1 + tK[[t]].$$

Предложение 14. Для любых k -модулей E, F имеет место изоморфизм

$$\coprod_{i+j=r} \wedge^i(E) \otimes \wedge^j(F) \rightarrow \wedge^r(E \oplus F).$$

Доказательство. Доказательство предоставляется читателю в качестве упражнения.

Следствие. Отображение λ_t , описанное выше, является гомоморфизмом \mathfrak{M}_G в мультипликативную группу $1 + tK[[t]]$.

Ввиду универсальности $K(G)$ мы можем продолжить λ_t на $K(G)$ [или, более точно, пропустить λ_t через $K(G)$]. Индуцированное отображение на $K(G)$ будет снова обозначаться через λ_t .

Обозначим через $s^i(E)$ элемент $\gamma(S^i(E))$ в кольце Гротендика.

Предложение 15. Для любого G -модуля E положим

$$s_t(E) = \sum_{i=0}^{\infty} s^i(E) t^i.$$

Тогда $s_t(E) \lambda_{-t}(E) = 1$.

Доказательство этого утверждения сложнее, и необходимая для его получения техника составляет первую главу любого изложения, имеющего дело с более глубокими аспектами только что введенных структур.

В заключение — один пример.

Предположим, что E одномерно над k . Тогда $\lambda^i(E) = 0$ для $i > 0$. Следовательно,

$$\lambda_t(E) = 1 + \gamma(E)t$$

и

$$\lambda_{-t}(-\gamma(E)) = \frac{1}{1 - \gamma(E)t} = 1 + \gamma(E)t + \gamma(E)^2 t^2 + \dots$$

В случае когда группа G тривиальна, можно дать простое доказательство предложения 15, сведя его к одномерному случаю.

§ 9. Некоторые функториальные изоморфизмы

Начнем с одного абстрактного определения. Пусть \mathfrak{A} , \mathfrak{B} — две категории. Функторы из \mathfrak{A} в \mathfrak{B} (скажем, ковариантные от одной переменной) могут рассматриваться как объекты некоторой категории, морфизмы которой определяются следующим образом. Если L , M — два таких функтора, то морфизм $H: L \rightarrow M$ — это правило, которое каждому объекту X из \mathfrak{A} сопоставляет морфизм $H_X: L(X) \rightarrow M(X)$ из \mathfrak{B} , такой, что для любого морфизма $f: X \rightarrow Y$ из \mathfrak{A} коммутативна следующая диаграмма:

$$\begin{array}{ccc} L(X) & \xrightarrow{H_X} & M(X) \\ L(f) \downarrow & & \downarrow M(f) \\ L(Y) & \xrightarrow{H_Y} & M(Y) \end{array}$$

Мы можем поэтому говорить об изоморфизме функторов. Ниже мы увидим примеры подобных изоморфизмов в теории тензорных произведений. Категории, рассматриваемые в наших приложениях, являются аддитивными, т. е. в них множества морфизмов образуют аддитивные группы, а закон композиции \mathbf{Z} -билинеен. В этом случае функтор L называется *аддитивным*, если $L(f + g) = L(f) + L(g)$.