

Представления конечных групп

§ 1. Полупростота групповой алгебры

Пусть k — поле и G — группа. Образует групповую алгебру $k[G]$. Как объяснялось в гл. V, § 1, она состоит из всех формальных линейных комбинаций

$$\sum_{\sigma \in G} a_{\sigma} \sigma$$

с коэффициентами $a_{\sigma} \in k$, почти все из которых равны 0. Произведение берется естественным образом:

$$\left(\sum_{\sigma \in G} a_{\sigma} \sigma \right) \left(\sum_{\tau \in G} b_{\tau} \tau \right) = \sum_{\delta, \tau} a_{\sigma} b_{\tau} \sigma \tau.$$

Пусть E — векторное пространство над k . Всякий гомоморфизм алгебр

$$k[G] \rightarrow \text{End}_k(E)$$

индуцирует гомоморфизм групп

$$G \rightarrow \text{Aut}_k(E),$$

и таким образом, представление кольца $k[G]$ в E порождает представление группы G . Если задано такое представление, то мы будем также говорить, что $k[G]$ или G *действует* на E . Отметим, что задание представления превращает E в модуль над кольцом $k[G]$.

Обратно, если задано представление группы, скажем $\rho: G \rightarrow \text{Aut}_k(E)$, то мы можем следующим образом продолжить ρ до представления алгебры $k[G]$. Пусть $\alpha = \sum a_{\sigma} \sigma$ и $x \in E$. Положим

$$\rho(\alpha)x = \sum a_{\sigma} \rho(\sigma)x.$$

Непосредственно проверяется, что этим определено продолжение ρ до кольцевого гомоморфизма $k[G]$ в $\text{End}_k(E)$. Мы будем говорить, что представление ρ — *точное* на G , если отображение $\rho: G \rightarrow \text{Aut}_k(E)$ инъективно. Продолжение ρ на $k[G]$ может, однако, и не быть точным.

Имея дело с фиксированным представлением группы G на E , мы часто будем писать σx вместо $\rho(\sigma)x$. Векторное пространство E

вместе с представлением ρ будет называться G -модулем или G -пространством, а также (G, k) -пространством, если нам захочется специально отметить поле k . Напомним, что если E, F — G -модули, то G -гомоморфизмом называется такое k -линейное отображение $f: E \rightarrow F$, что $f(\sigma x) = \sigma f(x)$ для всех $x \in E$ и $\sigma \in G$.

Отметим, что ядром заданного G -гомоморфизма $f: E \rightarrow F$ служит G -подмодуль в E и что k -факторпространство $F/f(E)$ допускает, и притом единственным образом, такое действие G , что каноническое отображение $F \rightarrow F/f(E)$ является G -гомоморфизмом.

Если G действует на k -пространствах E и F , то мы можем естественным образом определить действие G на $\text{Hom}_k(E, F)$. Действительно, положим для $f \in \text{Hom}_k(E, F)$ и $\sigma \in G$

$$(\sigma f)(x) = \sigma(f(\sigma^{-1}x)).$$

Тогда $(\sigma\tau)f = \sigma(\tau(f))$. Чтобы не произошло путаницы с композицией σ и f , мы, когда нам потребуется иметь дело с такой итерацией, будем писать $\sigma \circ f$ для обозначения отображения $x \mapsto \sigma(f(x))$ и аналогично $f \circ \sigma$. Отметим, что f является G -гомоморфизмом в том и только в том случае, если $\sigma f = f$ для всех $\sigma \in G$.

Пусть E — G -модуль. Мы будем обозначать через E^G подмодуль, состоящий из всех элементов $x \in E$, таких, что $\sigma x = x$ для всех $\sigma \in G$.

Под *тривиальным* представлением $\rho: G \rightarrow \text{Aut}_k(E)$ мы будем понимать представление, при котором $\rho(G) = 1$. Представление тривиально тогда и только тогда, когда $\sigma x = x$ для всех $x \in E$ и всех $\sigma \in G$. В этом случае мы будем также говорить, что G действует тривиально. Это можно еще записать в виде $E = E^G$.

Пусть G — конечная группа и E — G -модуль. Мы можем определить операцию $\text{Tr}_G: E \rightarrow E$, являющуюся k -гомоморфизмом, а именно положив

$$\text{Tr}_G(x) = \sum_{\sigma \in G} \sigma x.$$

Отметим, что элементы $\text{Tr}_G(x)$ лежат в E^G , т. е. неподвижны относительно действия всех элементов G . Действительно,

$$\tau \text{Tr}_G(x) = \sum_{\sigma \in G} \tau \sigma x,$$

а умножение слева на τ лишь переставляет элементы из G .

Если, в частности, $f: E \rightarrow F$ — k -гомоморфизм G -модулей, то $\text{Tr}_G(f): E \rightarrow F$ является G -гомоморфизмом.

Предложение 1. Пусть G — конечная группа, E', E, F, F' — G -модули и

$$E' \xrightarrow{\psi} E \xrightarrow{f} F \xrightarrow{\psi'} F'$$

— k -гомоморфизмы, причем φ, ψ — G -гомоморфизмы. Тогда

$$\mathrm{Tr}_G(\psi \circ f \circ \varphi) = \psi \circ \mathrm{Tr}_G(f) \circ \varphi.$$

Доказательство. Имеем

$$\begin{aligned} \mathrm{Tr}_G(\psi \circ f \circ \varphi) &= \sum_{\sigma \in G} \sigma(\psi \circ f \circ \varphi) = \sum_{\sigma \in G} (\sigma\psi) \circ (\sigma f) \circ (\sigma\varphi) = \\ &= \psi \circ \left(\sum_{\sigma \in G} \sigma f \right) \circ \varphi = \psi \circ \mathrm{Tr}_G(f) \circ \varphi. \end{aligned}$$

Теорема 1 (Машке). Пусть G — конечная группа порядка n и k — поле, характеристика которого не делит n . Тогда групповое кольцо $k[G]$ полупросто.

Доказательство. Пусть E — G -модуль и F — G -подмодуль. Так как k — поле, то существует k -подпространство F' , такое, что E будет k -прямой суммой F и F' . Проекция на F есть k -линейное отображение $\pi: E \rightarrow F$. Очевидно, $\pi(x) = x$ для всех $x \in F$. Положим

$$\varphi = \frac{1}{n} \mathrm{Tr}_G(\pi).$$

Имеем два G -гомоморфизма

$$0 \rightarrow F \begin{array}{c} \xrightarrow{j} \\ \xleftarrow{\varphi} \end{array} E,$$

причем j — вложение и $\varphi \circ j = \mathrm{id}$. Отсюда вытекает, что E есть G -прямая сумма F и $\mathrm{Ker} \varphi$, чем и доказано, что $k[G]$ полупросто.

Во всем последующем мы будем предполагать, что G — конечная группа и что все векторные пространства E над k конечномерны. Через n мы обычно обозначаем порядок группы G . Всюду предполагается, что характеристика поля k не делит n .

§ 2. Характеры

Пусть $\rho: k[G] \rightarrow \mathrm{End}_k(E)$ — некоторое представление. Под *характером* χ_ρ этого представления мы будем понимать k -значную функцию

$$\chi_\rho: k[G] \rightarrow k,$$

такую, что $\chi_\rho(\alpha) = \mathrm{tr} \rho(\alpha)$ для всех $\alpha \in k[G]$. След здесь — это след эндоморфизма, определенный в гл. XIII, § 2. При выбранном базисе для E над k он равен следу матрицы, представляющей $\rho(\alpha)$, т. е. сумме ее диагональных элементов. Как мы уже видели раньше, след не зависит от выбора базиса. Иногда мы вместо χ_ρ будем писать χ_E . Мы будем также называть E *пространством представления* ρ .